


FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES ADYACENTES

FASCÍCULO 163

FAMILIA BERBERIDACEAE

Por Sergio Zamudio

Instituto de Ecología A.C.
Centro Regional del Bajío
Pátzcuaro, Michoacán, México
en colaboración con



CONACYT



CONABIO

2009

La Flora del Bajío y de regiones adyacentes pretende ser básicamente un inventario de las especies de plantas vasculares que crecen en forma silvestre en los estados de Guanajuato, de Querétaro y en la parte septentrional de Michoacán. En este último quedan incluidas las áreas ubicadas al este del meridiano 102° 10' W y al norte del parteaguas de la cuenca del río Balsas.

La Flora es un esfuerzo cooperativo, crítico, coordinado por el Instituto de Ecología A.C., en el que participarán investigadores del mismo, así como de otros organismos nacionales y algunos extranjeros.

La Flora se edita en forma de fascículos sin secuencia preestablecida. Cada fascículo corresponde en principio a una familia. Además, se edita una serie paralela de fascículos complementarios, que dan cabida a temas ligados al universo vegetal del área, pero que no serán propiamente contribuciones taxonómicas.

Editores: Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón de Rzedowski

Producción Editorial: Rosa Ma. Murillo

Revisión Formación tipográfica: Patricia Y. Mayoral y Violeta Espinosa Cardoso

Este fascículo se publica gracias al apoyo económico recibido de:

- el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

La serie Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes es una publicación irregular, diciembre de 2009. Editor Responsable: Jerzy Rzedowski Rotter. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2004-07191981900-102. Número de Certificado de Licitud de título: 13455. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 11028. Domicilio de la publicación: Ave. Lázaro Cárdenas, núm. 253, apartado postal 386, 61600 Pátzcuaro, Michoacán, México. Imprenta: Imprenta Tavera Hermanos, S.A. de C.V. Ave. Lázaro Cárdenas, núm. 3052, Col. Chapultepec Sur, 58260 Morelia, Michoacán, México. Distribuidor: Instituto de Ecología A. C., Centro Regional del Bajío, Ave. Lázaro Cárdenas, núm. 253, apartado postal 386, 61600 Pátzcuaro, Michoacán, México.

ISSN 0188-5170

www1.inecol.edu.mx/publicaciones/LISTADO_FLOBA_LINKS.htm

BERBERIDACEAE

Por Sergio Zamudio^{*,**}
Instituto de Ecología, A.C.
Centro Regional del Bajío
Pátzcuaro, Michoacán

Plantas herbáceas perennes, arbustos o árboles bajos; hojas alternas u opuestas, a veces basales, simples o compuestas, rara vez peltadas, con o sin estípulas, enteras a profundamente partidas, aserradas, dentado-espinosas o reducidas a espinas, con venación pinnada o palmada; flores solitarias o en inflorescencias terminales o laterales, en forma de racimos, espigas, panículas o cimas, por lo general bracteadas, pedicelos con o sin bracteolas o profilos; flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras, el perianto más o menos diferenciado en cáliz y corola; cáliz con 3 a 9 sépalos, en 1 a 3 pseudociclos, verdosos o corolinos; corola amarilla, con 3 a 6 o más pétalos nectaríferos, dispuestos en 1 a 2 (o más) pseudociclos; estambres generalmente 6 y epipétalos o en número indefinido, filamentos cortos, a veces con dos pequeños dientes debajo de la antera, antera biteca, de dehiscencia valvar; ovario súpero, unicarpelar, unilocular, con placentación parietal o basal, sésil o atenuado en la base, estilo ausente o muy corto, estigma capitado o peltado; óvulos uno a numerosos, anátropos, rara vez ortótropos; fruto generalmente en forma de baya o con menos frecuencia de folículo, aquenio, o cápsula; semillas a veces ariladas, con embrión pequeño, recto.

Familia con 10 a 15 géneros y más de 650 especies, distribuidas principalmente en las regiones templadas del Hemisferio Norte, desde Asia oriental hasta Norteamérica. En México solamente se presenta el género *Berberis*.

* Se agradece a Armando Butanda, Gilberto Ocampo y Lourdes Rico su ayuda en la consecución de literatura especializada, a Jerzy Rzedowski por la traducción de textos del alemán al español, a Rogelio Cárdenas por la elaboración de los dibujos y a los encargados de los herbarios B, ENCB, HAL, IBUG, IEB, K, MEXU, QMEX, y XAL por las facilidades otorgadas para consultar sus colecciones.

** Trabajo realizado con apoyo económico del Instituto de Ecología, A.C. (cuenta 20006), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

BERBERIS L.*

Mahonia Nuttall

Odostemon Rafinesque

Arbustos o árboles bajos; tallos con el leño amarillo; espinosos o inermes; hojas alternas, simples o compuestas e imparipinnadas o trifolioladas, con o sin estípulas, en nuestras especies las estípulas son membranáceas y están unidas a la base del peciolo por ambos lados, separándose en el ápice en una o varias puntas lanceoladas a filiformes, por lo general pronto caedizas, raquis articulado en el punto de inserción de los foliolos, foliolos sésiles o cortamente peciolulados, coriáceos y gruesos a delgados y membranáceos, enteros, ondulados, aserrados o dentados, inermes o espinosos; inflorescencias en forma de racimos, cimas o panículas, en otras ocasiones las flores solitarias o fasciculadas, cubiertas por varias brácteas en la base, flores pediceladas, los pedicelos a veces con 1 a 2 bracteolas o profilos; cáliz formado por 3 a 9 sépalos, dispuestos en 1 a 3 series, verdes o por lo general corolinos; corola con 6 pétalos, cada pétalo con dos glándulas nectaríferas en la base, amarillos, ápice entero, retuso o emarginado; estambres 6, opuestos y unidos a la base de los pétalos, filamentos cortos, a veces con dos dientes laterales debajo de la antera; ovario unilocular, estilo ausente o muy corto, estigma sésil o rara vez peltado; fruto en forma de baya jugosa o semiseca, agridulce, azul obscura, roja o rojizo-amarillenta, a veces pruinosa; semillas de color café-rojizo o amarillentas.

Género con más de 600 especies, ampliamente distribuido en Europa, Asia, la parte norte de África y América; en el continente americano se encuentra desde Canadá hasta Tierra de Fuego. En México existen cerca de 40 especies, de las cuales ocho se encuentran en el Bajío y regiones adyacentes. En general tienen uso maderable, aunque algunas especies se han empleado como materia prima para elaborar colorantes, mientras que otras se cultivan como ornamentales y en algunas el fruto se registra como comestible.

* Referencias: Fedde, F. Versuch einer Monographie der Gattung *Mahonia*. Bot. Jahrb. Syst. 31: 30-133. 1901.

Marroquín, J. S. A monographic study of the genus *Berberis* L. in Mexico. Thesis PhD. Graduate School of Arts and Sciences. Northeastern University. Boston, Massachusetts. 177 pp. 1972.

Marroquín, J. S. Berberidáceas de México I. Cuad. Inst. Invs. Ciens. UANL., Méx. 15: 1-21. 1972.

Marroquín, J. S. Berberidaceae. Flora de Veracruz 75: 1-16. 1993.

Zamudio, S. Notas sobre el género *Berberis* (Berberidaceae) en México. Acta Bot. Mex. 87: 31-70. 2009.


- 1 Plantas con las flores dispuestas en panículas de igual longitud o más largas que las hojas.
 - 2 Foliolos con las venas impresas o hundidas en el haz, poco conspicuas; estambres sin dientes; planta común en el extremo noreste de Querétaro *B. hartwegii*
 - 2 Foliolos con las venas resaltadas en el haz, formando una retícula densa muy conspicua, estambres con dientes cortos; planta abundante en el noreste de Guanajuato y Querétaro *B. pallida*
- 1 Plantas con las flores dispuestas en racimos o dicasios multifloros, por lo general más cortos que las hojas.
 - 3 Inflorescencias en forma de dicasios multifloros, hojas con 5 a 7(9) foliolos, muy juntos y sobrepuestos, gruesos y coriáceos, muy rígidos, marcadamente dentado-espinosos; arbusto escaso en la zona árida de Querétaro *B. albicans*
 - 3 Inflorescencias en forma de racimos; hojas variables en forma y número de foliolos.
 - 4 Hojas con foliolos oblongos a angostamente oblongo-elípticos, muy espaciados, ápice obtuso o redondeado, a veces emarginado, nunca mucronado, margen entero; racimos axilares laxos; elemento escaso en el noreste de Querétaro *B. chochoco*
 - 4 Hojas con foliolos ovados a lanceolados, ápice agudo u obtuso, mucronado-espinoso, margen claramente dentado-espinoso, espinas de diferente tamaño; racimos compactos, axilares o terminales.
 - 5 Arbusto rastrero o decumbente, menor de 1 m de alto; hojas largamente pecioladas, con 3 foliolos como cifra predominante, rara vez 5 o 7, cercanos y sobrepuestos, ovados a ampliamente ovados, de (1.3)2 a 6.5 cm de largo, por 1.5 a 4.3 cm de ancho, margen fuertemente dentado-espinoso, con 2 a 6(11) espinas por lado; elemento sólo conocido de las partes altas de la Sierra del Doctor y del cerro Zamorano *B. alpina*
 - 5 Arbustos erectos o árboles bajos, mayores de 1 m de altura.
 - 6 Inflorescencias en forma de racimos subumbelados, de 2.5 a 4 cm de largo, con 3 a 5 flores, pedúnculo comprimido; hojas de 3 a 6 cm de largo, con (3)5 a 7 foliolos angostos, elípticos, ovado-elípticos o lanceolados, de 1 a 3.5 cm de largo, por 0.5 a 1.2 cm de ancho, coriáceos, peciolo cortos, persistentes en las ramillas; elemento muy raro en el noreste de Guanajuato *B. muelleri*
 - 6 Inflorescencia en forma de racimos simples, multifloros, pedúnculos rollizos; hojas con (3)5 a 15 foliolos lanceolados, ovado-lanceolados, a suborbiculares, de 2 a 10 cm de largo, por 1 a 5 cm de ancho, más o menos coriáceos.

- 7 Foliolos ovados, ampliamente ovados a ovado-lanceolados, margen entero, débilmente dentado o aserrado, con 6 a 12(14) dientes por lado, espinas cortas; el primer par de foliolos situado 2 a 7 cm por arriba de la base de la hoja, el raquis de las hojas y de las inflorescencias con frecuencia teñido de color rojo o púrpura; fruto con estilo evidente, elemento que crece sobre suelo derivado de rocas calizas, en la porción noreste de Guanajuato y Querétaro, entre 1400 y 2500 m *B. gracilis*
- 7 Foliolos lanceolados a ovado-lanceolados, margen fuertemente dentado o aserrado-espinoso, con (4)5 a 11(15) dientes por lado, espinas de 0.25 a 3(4) mm de largo, el primer par de foliolos en general más chico que los superiores y cercano a la base de la hoja; fruto sin estilo; elemento que crece sobre suelo derivado de rocas ígneas en el centro y S de Guanajuato, en el extremo S de Querétaro y en el N de Michoacán; entre 1800 y 3150 m *B. moranensis*


Berberis albicans Zamudio & Marroquín, Southw. Naturalist 32(4): 483. 1987.

Nombre común registrado en la zona: ortiga.

Arbusto de 0.3 a 1.25 m de alto, leño amarillo pálido; hojas de 3.6 a 12 cm de largo, peciolo corto y persistente, abrazando al tallo, de 3 a 7(15) mm de largo, lámina compuesta por 5 a 7(9) foliolos sésiles, cercanos y sobrepuestos, ovados o elípticos a suborbiculares, de (1)2 a 6 cm de largo, por (1)2 a 5 cm de ancho, ápice truncado o agudo, mucronado-espinoso, base cordada o truncada, oblicua, margen gruesamente dentado-espinoso, con 3 a 7(12) dientes por lado, venación reticulada, vena media prominente, con 1 o 2(3) pares de venas laterales basales, coriáceos, muy rígidos, ondulados y crespos, de color verde a café, glaucos, un poco brillantes en el haz, pálidos en el envés; inflorescencias axilares en forma de dicasios multifloros, cortos, de 2.3 a 9 cm de largo, pedúnculos de 0.5 a 3.2 cm de largo, angulosos, brácteas florales triangular-cimbiformes, de (1)1.5 a 2.5 mm de largo, pedicelos de 2 a 6 mm de largo, bracteolas ausentes; flores amarillas; sépalos externos ovados, de 1.5 a 2 mm de largo, por 1 a 1.5 mm de ancho, sépalos medios ampliamente ovados a ampliamente elípticos, de 2.5 a 3.5 mm de largo, por 2 a 2.5 mm de ancho, sépalos internos obovados, de 3.5 a 4.5 mm de largo, por 2.5 a 3 mm de ancho; pétalos ovados, de 2 a 4.5 mm de largo, por (1)2 a 3 mm de ancho, ápice agudo, emarginado; estambres de 1.5 a 2.8 mm de largo, sin dientes; fruto subgloboso o elipsoide, de 7 a 11 mm de largo, por 7 a 10 mm de ancho, sin estilo, azul oscuro, pruinoso o glauco en la madurez; semillas 1 a 4 por fruto,



Berberis albicans Zamudio & Marroquín. A. hábito; B. rama con inflorescencia; C. hoja; D. flor con algunos sépalos y pétalos retirados; E. 1. sépalo externo, 2. sépalo medio, 3. sépalo interno; 4. pétalo; F. fruto; G y H. semillas. (Dibujos de Manuel Barbosa, Figs. D., E., F, y G de Rogelio Cárdenas). Reproducido en parte de Southw. Naturalist 32(4): 181.



elipsoides a obovoides, de 4.5 a 6.5 mm de largo, por 2.5 a 4.5 mm de ancho, de color café-rojizo oscuro.

Especie de distribución restringida a algunas barrancas de los tributarios del río Moctezuma, en la zona árida limítrofe entre los estados de Hidalgo y Querétaro, habita en laderas muy inclinadas de rocas calizas y lutitas, con vegetación de matorral xerófilo, o en la transición de éste con el bosque de pino piñonero. Alt. 1950-2350 m. Florece de mayo a septiembre y se encuentra con frutos de agosto a marzo.

Elemento endémico de la zona árida queretano-hidalguense. Qro. (tipo: S. Zamudio 3666 (holotipo en ENCB, isotipos en IEB y MEXU), Hgo.

Planta escasa en la zona árida de la parte central del estado de Querétaro, pero al parecer sin problemas de supervivencia.

Querétaro: al SSW de Cuatro Palos, municipio de Pinal de Amoles, *E. Carranza* 2299 (IEB); Las Calabazas, en las cercanías de Corral Blanco, municipio de San


Joaquín, S. Zamudio y E. Pérez 7979 (IEB); ladera NW de la Sierra Peña Azul, ± 8 km al W de Vizarrón, municipio de Cadereyta, S. Zamudio 11094 (IEB); 500 m al W de Vizarrón, municipio de Cadereyta, S. Zamudio 3666 (ENCB, IEB, MEXU); 2 km al W de Vizarrón, municipio de Cadereyta, R. Fernández y S. Zamudio 969 (IEB, MEXU); 500 m al W de Vizarrón, municipio de Cadereyta, S. Zamudio 2322 (IEB, MEXU); cerros calizos al E de Vizarrón, municipio de Cadereyta, R. Hernández 10785 (QMEX); 500 m al NE de Los Luna, municipio de Cadereyta, 20°44'18" N, 99°39'57" W. S. Zamudio y M. E. Molina 13426 (IEB); cerros cercanos a la Barranca del Sordo, municipio de Cadereyta 20°41'9" N, 99°37'17" W, R. Hernández M. 12112 (IEB, QMEX); Mesa de León, ejido Vista Hermosa, municipio de Cadereyta, M. Gómez-Peralta 658 (IEB, QMEX).

No se conoce algún uso para este arbusto en la región de estudio.

Berberis alpina Zamudio. Acta Bot. Mex. 87: 44. 2009. *Mahonia schiedeana* sensu Fedde, Bot. Jahrb. Syst. 31: 90. 1901, pro parte; *Berberis schiedeana* sensu Marroquín, Thesis PhD Northeastern University, Boston, Mass., 1972, non *Berberis schiedeana* Schltdl. *Odostemon trifolius* sensu Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23: 272. 1922, non *Mahonia trifolia* Schltdl. & Cham.

Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: acebo, palo amarillo.


Arbusto rizomatoso, rastrero o decumbente, de 0.1 a 1 m de alto, crece formando grupos densos; hojas largamente pecioladas, de 3.5 a 20 cm de largo, peciolo de 3 a 9 cm de largo, lámina compuesta por 3 (a veces 5 y rara vez 7) foliolos sésiles (en los nuestros 3 a 5), el raquis del foliolo terminal es muy corto o está ausente, por lo que éstos están muy juntos y sobrepuestos, foliolos ovados a ampliamente ovados, de (1.3)2 a 6.5 cm de largo, por 1.5 a 4.3 cm de ancho, ápice agudo, mucronado-espinoso, base cuneada a redondeada, oblicua, margen fuertemente dentado-espinoso, con 2 a 6(11) espinas por lado, éstas de 1.5 a 4.5 mm de largo, venación fuertemente reticulada, coriáceos, rígidos, de color verde pardo, superficie brillante en el haz, más pálida y opaca en el envés; inflorescencia en forma de racimos axilares cortos, fasciculados, de 1.5 a 4.5 cm de largo, brácteas de la inflorescencia triangulares, de 6.5 a 9 mm de largo, por 3 a 6 mm de ancho, pedicelos delgados, 4.5 a 15 mm de largo, brácteas florales triangulares, acuminadas, de 2 a 4 mm de largo, por 1 a 2.5 mm de ancho, bracteolas lanceoladas, acuminadas, de posición variable aunque con mayor frecuencia insertas cerca de la mitad del pedicelo; flores amarillas; sépalos externos ovados a ampliamente ovados, de (1.5)2 a 3.5 mm de largo, por 1.5 a 3 mm de ancho, sépalos medios oblongos a obovados, de 3 a 6 mm de largo, por 2.5 a 4 mm de



Berberis alpina Zamudio. A. hábito; B. inflorescencia; C. flor vista de frente mostrando los pétalos emarginados y los estambres dentados; D. 1. sépalo externo, 2. sépalo medio, 3. sépalo interno, 4. pétalo; E. fruto; F y G. semillas. (Dibujo de Rogelio Cárdenas). Reproducido de Acta Bot. Mex. 87: 45. 2009.

ancho, sépalos internos obovados, de 5.5 a 10 mm de largo, por 3 a 6.5 mm de ancho; pétalos obovados, emarginados en el ápice, de 5.5 a 7.5 mm de largo, por 3 a 4 mm de ancho; estambres de (3.5)4 a 6 mm de largo, dentados, los dientes descendentes; fruto ovoide, de 8 a 14 mm de largo, por 6 a 11 mm de ancho, sin estilo, de color azul pruinoso; semillas 6 a 7 por fruto, obovoides, triquetras, de 4 a 5.5 mm de largo, por 2 a 3 mm de ancho, café-rojizas.

Arbusto escaso en nuestra zona de estudio, en donde se conoce sólo de la parte alta del Cerro Zamorano y de la Sierra de El Doctor; crece en terrenos rocosos o sobre riscos, formando grupos densos, en praderas alpinas y subalpinas, o en el límite superior de los bosques de pino, pino-encino y oyamel. Alt. (2800)3000-4200 m. Se ha colectado con flor casi durante todo el año, de enero a noviembre y con fruto de abril a noviembre.



Especie endémica de las montañas más altas del centro de México, principalmente del Eje Volcánico Transversal. Gto., Qro., Hgo., Méx. (tipo: *C. G. Pringle* 6218 (MEXU)), D.F., Pue., Ver.

Elemento muy escaso en nuestra área de estudio, aunque resistente a la perturbación, por lo que no parece vulnerable a la extinción.

Guanajuato: parte alta del cerro Zamorano, municipio de Tierra Blanca, *J. Rzedowski* 47797 (IEB, MEXU, XAL).

Querétaro: parte alta del cerro Zamorano, municipio de Colón, *J. Rzedowski* 44435 (IEB, MEXU, QMEX, XAL); Cerro El Zamorano, Puerto del Carmen, municipio de Colón, *E. Pérez y G. Ocampo* 4176 (IEB); Sierra del Doctor, cerca de la antena de telecomunicaciones, municipio de Cadereyta, *S. Zamudio y E. Pérez* 9614 (IEB); cerro El Espolón, cerca del rancho El Pinalito, municipio de Cadereyta, *E. Pérez y S. Zamudio* 3479 (IEB); ± 7 km al SE de Chavarrias, por el camino a Altamira, municipio de Cadereyta, *S. Zamudio* 7278 (IEB).

Por mucho tiempo a los ejemplares de esta especie se les adjudicó erróneamente el nombre de *Berberis schiedeana* Schltdl., sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que tal nombre es sinónimo de *Berberis trifolia* Schltdl. & Cham., arbusto que crece en los llanos o partes planas entre la Laguna de Alchichica, Puebla y Perote, Veracruz.


Berberis chochoco Schltdl., Bot. Zeitung (Berlin) 12. 652. 1854. *Chrysodendron tinctorium* Terán & Berland., Memorias Comisión de Límites México-Estados Unidos, p. 7. 1832, non *Berberis tinctoria* Lesch (1822). *Mahonia chochoco* (Schltdl.) Fedde, Bot. Jahrb. Syst. 31: 103. 1901. *Odostemon chochoco* (Schltdl.) Standl., Proc. Biol. Soc. Wash. 31: 133. 1918. *Mahonia tinctoria* (Terán & Berl.) I.M. Johnst., Contr. Gray Herb. 70: 87-90. 1924.

Nombre común registrado en la zona: palo amarillo.

Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: chochoco, xoxoco.

Arbusto o árbol bajo, de 1.5 a 7 m de alto; hojas de 7 a 22 cm de largo, peciolo de (2.5)3 a 6 cm de largo, lámina compuesta por 5 a 9 folíolos muy espaciados entre sí, oblongos, oblongo-elípticos a angostamente elípticos, sésiles, de 3.5 a 7.5 cm de largo, por 0.7 a 3 cm de ancho, ápice obtuso a redondeado, a veces emarginado, base cuneada, margen entero, ondulado, venación reticulada, la retícula resaltada y más marcada en el haz, gruesos, coriáceos, de color verde oscuro, muy lustrosos en el haz, pálidos y menos lustrosos en el envés; inflorescencia en forma de racimos axilares laxos, de 5 a 11 cm de largo, brácteas de la inflorescen-

cia triangulares, de 4 a 6.5 mm de largo, por 4 a 5 mm de ancho, pedicelos 3 a 10 mm de largo, brácteas florales ovadas a lanceoladas, acuminadas, de 1 a 2 mm de largo, por 1 a 1.5 mm de ancho, bracteolas lanceoladas, ubicadas cerca de la base o en la parte media del pedicelo; flores amarillas; sépalos externos ampliamente ovados, acuminados, de 1 a 1.5 mm de largo, por 1 a 2 mm de ancho, sépalos medios ampliamente ovados, de 2 a 4 mm de largo, por 1.5 a 2.5 mm de ancho, sépalos internos obovados, de 4 a 6.5 mm de largo, por (2.5)3 a 3.5 mm de ancho; pétalos obovados a elípticos, ápice redondeado, entero o emarginado, de 4 a 5.5 mm de largo, por (1.5)2 a 3 mm de ancho, un poco más cortos que los sépalos internos; estambres de 3 a 4 mm de largo, con dientes cortos; fruto ovoide, de 9 a 12 mm de largo, por 6 a 9 mm de ancho, estilo corto, 0.5 a 1 mm de largo; semillas 2 a 4 por fruto, elipsoides u obovoides, triquetras, de 4.3 a 5.5 mm de largo, por (1.5)2 a 3 mm de ancho, café-rojizas.



Elemento raro en nuestra zona, en donde sólo se ha encontrado en la porción noreste de Querétaro; habita en cañadas o laderas de rocas calizas con vegetación de matorral submontano o bosque de pino piñonero y encino. Alt. (430)1000-2000(2500) m. Florece de junio a septiembre y se ha colectado con fruto de febrero a noviembre.

Las poblaciones de esta especie en nuestra zona de estudio son raras y con pocos individuos, por lo que se considera vulnerable a desaparecer del área.

Especie endémica de México, distribuida en la Sierra Madre Oriental, en los estados de N.L., Tamps. (lectotipo de *Chrysodendron tinctorium*: J. L. Berlandier 927 (GH), S.L.P., Qro., Hgo. (lectotipo: C. A. Ehrenberg 1250 (HAL, isoelectotipos en B, US)).

Querétaro: Landa de Matamoros - Tilaco, municipio de Landa, *H. Puig* 3607 (ENCB, MEXU); Puerto Colorado, ±3.5 km al sur de Acatitlán de Zaragoza, municipio de Landa, *E. González* 955 (IEB, MEXU, QMEX); 6 km al S de La Lagunita, camino a Tilaco, municipio de Landa, *E. Carranza* 840 (IEB, QMEX); cerca de Río Blanco, municipio de Peñamiller, *R. Hernández et al.* 10065 (IEB, MEXU, QMEX); 7 km al SE de Río Blanco, municipio de Peñamiller, *S. Zamudio* 3762 (IEB).


No se conocen usos para esta planta dentro del área de estudio, fuera de ella la madera se emplea como colorante y para extraer taninos.

Berberis gracilis Hartw. ex Benth., Pl. Hartw. p. 34, no. 271. 1840. *Mahonia gracilis* (Hartw. ex Benth.) Fedde, Bot. Jahrb. Syst. 31: 95. 1901. *Mahonia subintegrifolia* Fedde, Bot. Jahrb. Syst. 31: 94. 1901. *Odostemon gracilis* (Hartw. ex Benth.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23: 272. 1922. *Berberis gracilis* var. *madrensis* Marroquín, Cuad. Inst. Invs. Ciens. UANL., Méx. 15: 14. 1972.

Nombre común registrado en la zona: palo amarillo.

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: chiper cansino.

Arbusto o árbol bajo, de 1 a 8 m de alto; hojas de (4)5 a 15(30) cm de largo, el raquis con frecuencia teñido de color rojo o púrpura; peciolo de (1)2 a 7 cm de largo, lámina compuesta por (3)5 a 9(13) foliolos espaciados, que rara vez se sobreponen, ovados, ovado-lanceolados a suborbiculares, de 2 a 6(10) cm de largo, por (0.8)1 a 2(4) cm de ancho, ápice agudo, acuminado, rara vez mucronado, base cuneada, redondeada o subcordada, oblicua, margen entero, ondulado, débilmente dentado o aserrado, con 6 a 12(14) dientes con espinas cortas, menores de 2 mm de largo, venación reticulada, ligeramente resaltada en ambas caras, coriáceos, superficie verde oscura, brillante en el haz, opaca y más clara en el envés; inflorescencias en racimos axilares o apicales, de 3 a 15 cm de largo, el raquis con



Berberis gracilis Hartw. ex Benth. A. rama con inflorescencias e infrutescencia; B. variación en la forma de los foliolos; C. flor abierta mostrando el gineceo y androceo; D. 1. sépalo externo, 2. sépalo medio, 3. sépalo interno; 4. pétalo; 5. estambre; E. fruto. Ilustrado por Rogelio Cárdenas.

frecuencia teñido de color rojo o púrpura; brácteas de la inflorescencia lanceoladas, acuminadas, de (4)5 a 8 mm de largo, por (3)4 a 6 mm de ancho; pedicelos de 2 a 5 mm de largo, brácteas florales lanceoladas, largamente acuminadas, de 1 a 2 mm de largo, bracteolas lanceoladas, largamente acuminadas, situadas cerca de la base del pedicelo, ± 1 mm de largo; flores amarillas, sépalos externos ovados a muy ampliamente ovados, de 1.5 a 2.7 mm de largo, por 1.2 a 2.5 mm de ancho, sépalos medios ampliamente ovados, de 3 a 5 mm de largo, por 2.5 a 3 mm de ancho, sépalos internos obovados, de 5 a 8 mm de largo, por 3 a 5 mm de ancho; pétalos obovados a elípticos, de 5 a 7.5 mm de largo, por 3 a 4 mm de ancho, ápice redondeado, entero; estambres 4 a 5 mm de largo, con dientes cortos y agudos; fruto subesférico, de (8)10 a 12 mm de largo, por 7 a 8 mm de ancho, estilo conspicuo, de 2 a 3 mm de largo, azul pruinoso en la madurez; semillas 2 a 4 por fruto, obovoides a elipsoides, triquetras, de 5 a 6.5 mm de largo, por 2 a 3.5 mm de ancho, café rojizas, superficie brillante.


Elemento común en el extremo noreste de Guanajuato y Querétaro, habita en bosques de pino piñonero y enebro, de encino-pino y mesófilo de montaña. Alt. 1400-2500 m. Se ha observado en floración de octubre a abril y con frutos de enero a mayo.

Especie endémica de la Sierra Madre Oriental, se distribuye en los estados de N.L., Tamps. (tipo de *B. gracilis* var. *madrensis*: *P. S. Martin* 6 (MICH)), S.L.P., Gto., Qro., Hgo. (tipo: *K. T. Hartweg* 271 (K)), Ver., Oax.

Esta planta, aunque no es muy abundante, no parece encontrarse en peligro de desaparecer del área.

Guanajuato: 2 km al NW de Mesas de Jesús, municipio de San Luis de la Paz, *J. Rzedowski* 52816 (IEB); 2 km al NW de Mesas de Jesús, sobre el camino a San Antón, municipio de San Luis de la Paz, *J. Rzedowski* 53040 (IEB); La Ventana, Mesas de Jesús, municipio de San Luis de la Paz, *E. Ventura* y *E. López* 7833 (IEB); El Puerto Blanco, municipio de San Luis de la Paz, *E. Ventura* y *E. López* 9117 (IEB); El Coporito, municipio de Atarjea, *E. Ventura* y *E. López* 8874 (IEB); cerro Pichardo, municipio de Atarjea, *E. Ventura* y *E. López* 8262 (IEB); Cuicillos, municipio de Atarjea, *E. Ventura* y *E. López* 8282 (IEB).

Querétaro: 2-3 km al oriente de San Isidro, La Parada, municipio de Jalpan, *S. Servín* 765 (IEB); cañada de Las Avispas, al SE de San Juan de Los Durán, municipio de Jalpan, *E. Carranza* 2333 (IEB, QMEX, UAMIZ); Llano Chiquito, municipio de Landa, *S. Zamudio* y *E. Carranza* 7146 (IEB); Llano Chiquito, municipio de Landa, 21°23' N, 99°06' W, *S. Zamudio* y *E. Carranza* 10213 (IEB); el Llano Chiquito, municipio de Landa, *S. Zamudio* y *A. Ibarra* 12712 (IEB); Joya del Cerro Prieto, entre la Lagunita de San Diego y el Llano Chiquito, municipio de Landa, *S. Zamudio* y *E. Pérez* 10187 (IEB); cerro Piedra de La Cruz, al NE de Pinalito, municipio de Landa, *E. Carranza* 2720 (IEB, MEXU, QMEX, XAL); 1.5 km al poniente



del Puerto Hondo, municipio de Landa, *H. Rubio* 501 (IEB, MEXU, QMEX, XAL); 2 km al poniente del Puerto Hondo, El Banco, municipio de Landa, *H. Rubio* 611 (IEB, QMEX); El Banco, 1.5 km al SE de La Yesca, municipio de Landa, *H. Rubio* 2180 (IEB); 1 km al poniente de La Yesca, municipio de Landa, *H. Rubio* 1553 (IEB, QMEX); Puerto Verde, 5 km al SW de El Madroño, municipio de Landa, *E. González* 494 (IEB, MEXU, QMEX, UAMIZ); 3-4 km al SE del Parador Santa Martha, municipio de Landa, *E. Carranza* 3011 (IEB); 5-6 km al SE del Parador Santa Martha, municipio de Landa, *E. Carranza* 1624 (IEB, MEXU, QMEX, XAL); 5 km al E de La Vuelta, municipio de Landa, *E. González* 1233 (ENCB, IEB, QMEX); Puerto del Malpaís al SE de La Vuelta, municipio de Landa, *E. Carranza* 2231 (IEB); 23.5 mi. SW of Xilitla, road from Jalpa, ca. 21°15' N, 99°10' W., *G. L. Webster & G. J. Breckon* 16349 (MEXU, MO); 1 km a E de El Llano, municipio de Pinal de Amoles, *E. Carranza* 1717 (IEB, MEXU, QMEX, UAMIZ); al E de El Llano, municipio de Pinal

de Amoles, *E. Carranza 1461* (IBUG, IEB, MEXU, QMEX, XAL); 4 km al S de Río Blanco, municipio de Peñamiller, *J. Rzedowski 47713* (IEB, QMEX).

En la zona de estudio no se han registrado usos para esta planta.

Especie muy variable en el tamaño de la hoja, así como en el número y la forma de los foliolos. Aunque Marroquín (1972) describió la var. *madrensis*, para distinguir los arbustos altos o árboles con hojas de 7 a 20 cm de largo, compuestas por 5 a 13 foliolos, la gran variación encontrada en la especie no permite el reconocimiento de esta variedad, ya que se han observado ejemplares con formas intermedias en todos los caracteres usados para diferenciarla. El ejemplar de *J. Rzedowski 47713* (IEB, QMEX), colectado 4 km al S de Río Blanco, municipio de Peñamiller, presenta 3 foliolos por hoja consistentemente, por lo que se sale un poco de la variación conocida en la mayor parte de las poblaciones de la especie en este aspecto.

Berberis hartwegii Benth., Pl. Hartw. p. 34, no. 272. 1840. *Mahonia hartwegii* (Benth.) Fedde, Bot. Jahrb. Syst. 31: 109. 1901. *Mahonia paxii* Fedde, Bot. Jahrb. Syst. 31: 113. 1901. *Mahonia zimapana* Fedde, Bot. Jahrb. Syst. 31: 111. 1901. *Odostemon hartwegii* (Benth.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23: 270. 1922. *Odostemon paxii* (Fedde) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23: 271. 1922. *Berberis paxii* (Fedde) Marroquín & Laferr., J. Ariz.-Nev. Acad. Sci. 30(1): 54. 1997. *Berberis zimapana* (Fedde) Marroquín & Laferr., J. Ariz.-Nev. Acad. Sci. 30(1): 54. 1997.

Nombres comunes registrados en la zona: cigarrillo, laurel cimarrón, palo amarillo.

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: chochoco o xoxoco.

Arbusto o árbol bajo, poco ramificado, de 1 a 5 m de alto; hojas de (10)15 a 50 cm de largo, peciolo de (3)5 a 15(45) mm de largo, lámina con 7 a 15(17) foliolos peciolulados, peciólulos de 1 a 5 mm de largo, el par inferior más chico que los demás, limbo lanceolado, ovado, oblongo a ampliamente ovado o ampliamente elíptico, de 2.5 a 12(19) cm de largo, por (1.5)2 a 6.5(10) cm de ancho, ápice agudo, obtuso a redondeado, mucronato-espinoso, base cuneada a redondeada, asimétrica, margen entero, ondulado, aserrado o dentado, con frecuencia fuertemente revoluto, con 5 a 12(24) dientes espinosos por lado, espinas de 0.5 a 2.5(4) mm de largo, venación reticulada, el nervio medio y los secundarios impresos en el haz, los terciarios y cuaternarios poco conspicuos, todos los nervios resaltados en el envés, coriáceo a subcoriáceo, haz brillante, envés opaco, de color verde oliva a verde amarillento o café; inflorescencia en forma de panículas abiertas de 15 a 30(85) cm de largo, brácteas de la inflorescencia triangulares a ovadas, acumina-


das o dentadas en el ápice, de (5)8 a 18 mm de largo, por 6 a 12 mm de ancho, pedúnculo de 6 a 18 cm de largo, pedicelos de (3)5 a 20 mm de largo, brácteas florales lanceoladas, acuminadas, de 2 a 13 mm de largo, por 1.5 a 4 mm de ancho, bracteolas situadas por debajo de la parte media del pedicelo, lanceoladas a ovado-lanceoladas, acuminadas, de 1 a 2 mm de largo; flores de color amarillo pálido, blanco-amarillentas o blancas; sépalos externos ampliamente ovados, de 2.5 a 4.5 mm de largo, por 2 a 3 mm de ancho, sépalos medios obovados, de 5 a 7 mm de largo, por 3 a 5.5 mm de ancho, sépalos internos obovados, de 5.5 a 8 mm de largo, por 3 a 7 mm de ancho; pétalos obovados, emarginados, de 4 a 6(7) mm de largo, por 2.5 a 4 mm de ancho; estambres de 3 a 5 mm de largo, sin dientes; fruto globoso, azul pruinoso o glauco, sin estilo, de 8 a 11 mm de diámetro; semillas (2)6 a 12 por fruto, obovoides, de 4.5 a 6 mm de largo, por 2 a 4 mm de ancho, cafés a café-rojizas.

Arbusto o arbolito escaso en bosques mesófilo de montaña, de pino, de encino, de pino piñonero y en matorral submontano, en el extremo noreste de Querétaro. Alt. 1000-2300 m. Florece de enero a julio y fructifica de abril a octubre.

Especie endémica de la Sierra Madre Oriental, en los estados de Tamps. (lectotipo: *K. T. Hartweg* 272 (K, ex herb. Bentham), S.L.P., Qro., Hgo. (lectotipo de *Mahonia paxii*: *C. A. Ehrenberg* 1110 (HAL-064676); lectotipo de *Mahonia zimapanana*: *C. A. Ehrenberg* 1078 (B-100244043), Pue., Ver., Oax.

A pesar de ser una planta que no forma poblaciones densas, no parece enfrentar problemas de supervivencia.


Querétaro: alrededores de El Saucito, al N de Valle Verde, municipio de Jalpan, *E. Carranza* y *Y. Ramírez* 7335, 7336 (IEB); 2-3 km al N de Valle Verde (La Parada), municipio de Jalpan, *S. Servín* 93 (IEB); 3 km al ENE de Valle Verde, municipio de Jalpan, *E. Carranza* y *A. Blanco* 6061 (IEB); 1-2 km al E de Valle Verde (La Parada), municipio de Jalpan, *S. Servín* 2 (IEB); alrededores de Valle Verde (La Parada), municipio de Jalpan, *E. Carranza* 2353 (IEB); cañada de Las Avispas, 5-6 km al S de San Juan de los Durán, municipio de Jalpan, *S. Servín* 931 (IEB); extremo N del Llano Chiquito, municipio de Landa, *S. Zamudio et al.* 11471 (IEB); Joya del Cerro Prieto, entre la Lagunita de San Diego y el Llano Chiquito, municipio de Landa, *S. Zamudio* y *E. Pérez* 10189 (IEB); ±3.5 km al ENE de la Lagunita de San Diego, municipio de Landa, *E. Carranza et al.* 5389 (IEB); La Mesa, ±2 km al SE de la Lagunita de San Diego, municipio de Landa, *S. Zamudio* y *V. Steinmann* 12386 (IEB); la Lagunita de San Diego, municipio de Landa, *S. Zamudio* y *V. Steinmann* 12374 (IEB); 10 km al SW de El Madroño, sobre el camino a Landa, municipio de Landa, *J. Rzedowski* 46775 (IEB); 8 km al NE de la Lagunita por la carretera a Xilitla, municipio de Landa, *S. Zamudio* 6281 (IEB); Rincón de la Trampa, ±2 km al W de Acatitlán de Zaragoza, municipio de Landa, *E. González* 52 (IEB); Puerto del Gato, ±3 km al W de Acatitlán de Zaragoza, municipio de Landa, *E. González* 384




(IEB); aproximadamente 6 km al S de La Lagunita rumbo a Tilaco, municipio de Landa, *E. Carranza* 609 (IEB); 8.5-9 km por la carretera La Lagunita - Tilaco, municipio de Landa, *S. Zamudio* y *A. Ibarra* 12718 (IEB); ± 9 km de La Lagunita camino a Tilaco, municipio de Landa, *E. Carranza* e *I. Silva* 6361 (IEB); km 10 de la brecha entre La Lagunita y Tilaco, municipio de Landa, *S. Zamudio* 6332 (IEB); 10 km de La Lagunita, por el camino hacia Tilaco, municipio de Landa, *A. Herrera* 44 (IEB); aproximadamente 4-5 km al NW de Tilaco, municipio de Landa, *E. Carranza* 1597 (IEB); 5 km al N de Tilaco, municipio de Landa, *R. Fernández* 2749 (ENCB); 1 km al NW de El Sabinito, municipio de Landa, *H. Rubio* 1539 (IEB); 1.5 km al SE de El Sabinito, municipio de Landa, *H. Rubio* 429 (IEB); 11 km al SE de Agua Zarca, por el camino a Pisaflores, municipio de Landa, *S. Zamudio* 6261 (IEB); 1 km al NW de El Rincón, municipio de Landa, *H. Rubio* 2233 (IEB); brecha hacia la Redonda, municipio de San Joaquín, *R. Hernández et al.* 10495 (QMEX).

Especie muy variable en el tamaño de las hojas y en la forma y tamaño de los folíolos. Se aprecia una clara tendencia de cambio en las características de las hojas en función de las condiciones climáticas; así, las plantas que crecen en lugares con vegetación de bosque mesófilo de montaña o encinares húmedos son más grandes y presentan folíolos lanceolados, con el margen entero o con dientes muy cortos y espinas chicas, mientras que aquellas que lo hacen en ambientes más secos, con vegetación de bosque de pino piñonero o en el matorral submontano mantienen tallas menores y presentan hojas más cortas, con folíolos ovados, ampliamente oblongos o ampliamente elípticos, con el ápice redondeado, el margen con mayor número de dientes y espinas más grandes, con frecuencia fuertemente revoluto. Estas últimas formas han sido reconocidas como *Berberis paxii* (Fedde) Marroquín & Laferr. o como *B. zimapanana* (Fedde) Marroquín & Laferr. Aquí se considera que todas constituyen una sola especie muy variable distribuida ampliamente en la Sierra Madre Oriental.

Por otro lado, *Berberis hartwegii* es muy parecida a *B. pallida*, por lo que el material de las dos especies puede confundirse con facilidad. Una forma segura de diferenciarlos es comparando la venación de los folíolos en el haz; en ambos taxa ésta es reticulada, pero en *B. hartwegii* los nervios están impresos o hundi-



Comparación del patrón de venación de los folíolos entre *Berberis hartwegii* Benth. y *B. pallida* Hartw. ex Benth. A y B. *Berberis hartwegii*, con venas impresas o hundidas en la superficie de la lámina del folíolo en el haz y venas resaltadas en el envés; C y D. *Berberis pallida* con venas fuertemente reticuladas y resaltadas en ambas caras, pero más notorias en el haz que en el envés. Reproducido de Acta Bot. Mex. 87: 68. 2009.



Berberis hartwegii Benth. A. variación en las hojas; B. variación en la forma y tamaño de los foliolos. Ilustrado por Rogelio Cárdenas y reproducido de Acta Bot. Mex. 87: 61, 62. 2009.


dos en la superficie de la lámina, por lo que son poco conspicuos; mientras que en *Berberis pallida* se distinguen notoriamente resaltados sobre la superficie de la hoja. Adicionalmente en *B. hartwegii* se aprecia un mayor número de dientes por lado y es común observar los folíolos enrollados hacia atrás, ya que el margen es fuertemente revoluto. Otra diferencia entre estas dos especies es que en *B. pallida* los estambres son dentados, mientras que en *B. hartwegii* no presentan dientes. Debido a que ambas especies ocupan hábitats muy parecidos en la Sierra Madre Oriental, es muy probable que cuando coinciden en su distribución, se formen híbridos entre ellas.

Berberis moranensis Schult. & Schult.f., Syst. Veg. 7: 17. 1829., nombre basado en *Berberis pinnata* Kunth, in Humboldt, Bonpland & Kunth, Nov. Gen. Sp. 5: 71, t. 434. 1821; non *Berberis pinnata* Lag. 1803; non *Mahonia pinnata* (Lag.) Fedde, 1901; non *Berberis pinnata* Mühlenb., Cat. Pl. Amer. Sept. Ed. 2: 36. 1818. (fide Fedde, 1901: 79). *Berberis pinnata* Sessé & Mociño, Fl. Mexicana ed. 2, p. 84. 1894. *Mahonia moranensis* (Schult. & Schult. f.) I. M. Johnst., J. Arnold Arbor. 31: 190. 1950.

Nombres comunes registrados en la zona: agrillo, agrito, tiripo (lengua purépecha).

Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: agritos, cachisdá, camisdá, ixcapul serrano, palo amarillo, palo de teñir, palo jarilla, quisquirindin, quisquiringüin, retamilla, xoxoco, yagabuxe.

Arbusto o árbol bajo de 1 a 7(10) m de alto; hojas de 6 a 30 cm de largo, peciolo de (2)5 a 20(30) mm de largo, lámina compuesta por (5)7 a 11(15) folíolos, lanceolados a ovado-lanceolados, de 2 a 8(9) cm de largo, por 1 a 3(5) cm de ancho, ápice agudo, mucronado-espinoso, base cuneada, redondeada, o truncada, a veces cordada, asimétrica, margen dentado-espinoso, con (4)5 a 11(15) dientes por lado, espinas de 0.25 a 3(4) mm de largo; venación reticulada, lustroso y de color café a verde oscuro en el haz, pálido en el envés; inflorescencia en racimos axilares o terminales, solitarios o fasciculados, a veces muy densos, de 3 a 10 cm de largo, brácteas de la inflorescencia triangulares, acuminadas, de 3 a 10 mm de largo, por 3 a 8 mm de ancho, brácteas florales ovado-lanceoladas, acuminadas, de 2 a 2.5 mm de largo, por 1.5 a 2 mm de ancho; pedicelos delgados de (5)10 a 20 mm de largo, bracteolas de posición variable sobre el pedicelo, ovadas, acuminadas, de 1 a 1.5 mm de largo; flores amarillas, sépalos externos ovados, muy ampliamente ovados o deprimido-ovados, de 1 a 3.5 mm de largo, por 1 a 3 mm de ancho, sépalos medios elípticos a ampliamente elípticos, de 3 a 6 mm de largo, por 2 a 3.5 mm de ancho, sépalos internos obovados, de 6 a 8 mm de largo, por 3 a 5 mm de



Berberis moranensis Schult. et Schult.f. A. rama con flores y frutos jóvenes; B. flor en vista externa, a. sépalos, b. pétalos; C. flor abierta, c. estambre, d. pistilo; D. fruto; E. corte transversal del fruto. Ilustrado por Humberto Sánchez Córdoba y reproducido de la Flora Fanerogámica del Valle de México, Pátzcuaro, Mich., p. 182. 2001.

ancho, pétalos elípticos a oblongo-elípticos, de 5.5 a 7.5 mm de largo, por 2 a 3.5 mm de ancho, ápice emarginado, estambres de 4 a 5 mm de largo, dentados; fruto subesférico, de 8 a 11 mm de largo, por 6 a 10 mm de ancho, sin estilo, de color azul-pruinoso a azul-oscuro; semillas 4 a 8 por fruto, elipsoides, triquetras, de 4 a 5.5 mm de largo, por 2 a 3 mm de ancho, café-rojizas.

Elemento conocido del centro y sur de Guanajuato, del extremo sur de Querétaro, así como del norte de Michoacán, coincide en su distribución con las sierras del Eje Volcánico Transversal; crece en bosques de encino, pino y oyamel. Alt. (1800)2000-2800(3150) m. Se ha observado en floración de diciembre a julio y en fructificación prácticamente durante todo el año.


Planta endémica de México, aunque de muy amplia distribución: Sin., Gto., Qro., Hgo. (tipo: *A. Humboldt* & *A. Bonpland* s.n. (holotipo P, no localizado; isotipo P-00713464), Jal., Mich., Méx., D.F., Pue., Ver., Gro., Oax.

Aunque se restringe a la parte sur del Bajío, no parece estar en peligro de desaparecer del área.

Guanajuato: Cañada de la Virgen, municipio de Guanajuato, *J. Martínez-Cruz* 824 (MEXU), 901 (MEXU); ca. 8 km al NNW de Santa Rosa por la brecha a Picones, municipio de Guanajuato, *S. Zamudio* y *R. Ma. Murillo* 10836 (IEB); 1 km de Santa Rosa por el camino a Picones, municipio de Guanajuato, *E. Pérez* 4496 (IEB); Santa Rosa, municipio de Guanajuato, 21°04'31" N, 101°11'24" W, *S. Zamudio* 14409 (IEB); Llano Largo, municipio de Guanajuato, *J. Martínez-Cruz* 263 (MEXU); montañas de Santa Rosa, municipio de Guanajuato, Dec. 1894, *A. Dugés* s.n. (GH); s.n., 1895, (GH); s.n., 1901 (US); 8-10 km above (NE) of Santa Rosa, municipio de Dolores Hidalgo, *R. McVaugh* 23944 (MICH); cañada de la Peña Blanca, municipio de Acámbaro, *H. Díaz* 5260 (IEB).

Querétaro: Laguna de Servín, municipio de Amealco, 20°16'19" N, 100°16'02" W, *L. Hernández* 4946 (IEB, QMEX); 8 km de Amealco, sobre la carretera a Aculco, desviación a San Bartolo, municipio de Amealco, *G. Ocampo* y *E. Pérez* 1016 (IEB, QMEX).

Michoacán: ±7 km al NE de Polvillas, municipio de Epitacio Huerta, *S. Zamudio* 11687 (IEB); sierra de Zinapécuaro, 16 km al NE de Queréndaro, municipio de Zinapécuaro, *C. Jiménez* 262 (ENCB); Carindapaz, vicinity of Morelia, *G. Arsène* s.n., 5.V.1909 (GH, MO, US); ibid., *G. Arsène* 5478 (US); Rincón ca. Morelia, *G. Arsène* 2441 (MEXU, US); Filtros Viejos, al E de Morelia, municipio de Morelia, *J. S. Martínez* 1394 (ENCB, IEB); cerro Azul, vicinity of Morelia, *G. Arsène* 5367 (MEXU, MO, US); cerro Azul, SE Morelia, 2 km E junction with Agua Zarca, *R. T. Clausen* s.n., 22.IX.1955 (MEXU); 4 km al W de San Miguel del Monte, sobre el camino a Atécuaro, municipio de Morelia, *J. Rzedowski* 39684 (ENCB, IEB); W de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, *C. Medina* 1175a (IEB, XAL); arroyo Tiquio, al W de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, *L. Villanueva* 400 (IEB); ibid.,



H. Zepeda 147 (IEB); ± 3 km al NW de Umécuaro, municipio de Morelia, *S. Zamudio* 14136 (IEB); cañada del Real, cerca de San José de la Cumbre, municipio de Queréndaro, *J. S. Martínez* 1307 (ENCB, IEB, MEXU); camino Pátzcuaro - Erongarícuaro, municipio de Erongarícuaro, *J. Caballero* y *C. Mapes* 837 (IEB); pedregal de Charahuakuti, municipio de Erongarícuaro, *J. Caballero* y *C. Mapes* 277 (IEB); entre San Miguel Nocutzepo y Tócuaro, municipio de Erongarícuaro, *H. Díaz* 2186 (ENCB, IEB); Nocutzepo, municipio de Erongarícuaro, *J. Espinosa* 2460 (ENCB, IEB); 2 km al W de la exhacienda de Charahuen, municipio de Pátzcuaro, *M. E. Molina* y *E. Pérez* 49 (IEB); pedregal de Tócuaro, municipio de Erongarícuaro, *M. E. Molina* y *S. Zamudio* 474 (IEB); 2.5 km al SE de Ajuno, carretera Pátzcuaro - Uruapan, municipio de Pátzcuaro, *J. Espinosa* 2375 (ENCB, IEB, MEXU); alrededores del cerro de Las Nieves, municipio de Huiramba, *H. Díaz* 4762 (IEB); cerca de Acuitzio del Canje, municipio de Acuitzio, *H. Díaz* 2094 (ENCB, IEB, UAMIZ, XAL).

El fruto maduro de esta especie es dulce y comestible; además existen registros de que tanto el fruto como la madera se usan en la medicina tradicional. Por otra parte, esta última se emplea esporádicamente en la fabricación de artesanías.


Esta especie es notablemente variable a lo largo de su área de distribución, por lo que se han reconocido algunas variedades; sin embargo, es necesario realizar estudios más detallados para determinar si estos taxa infraespecíficos son verdaderos.

Berberis muelleri (I. M. Johnst.) Marroquín in Leferr. & Marroquín, Madroño 37(4): 287. 1990. *Mahonia muelleri* I. M. Johnst., J. Arnold. Arbor. 31: 189-190. 1950.

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: chiper.

Arbusto de 1 a 4 m de alto, muy ramificado; estípulas membranáceas, unidas a la base del peciolo y separándose en el ápice en uno a tres segmentos filiformes; hojas de 2 a 5(6.5) cm de largo, peciolo de 2 a 5 mm de largo, abrazando la ramilla y persistentes cuando las hojas caen, lámina compuesta por (3)5 a 7 foliolos, distantes, sésiles, elípticos a ovado-elípticos o lanceolados, de 1 a 3.5 cm de largo, por 0.5 a 1.2 cm de ancho, ápice agudo, mucronado-espinoso, base subcuneada a redondeada, margen gruesamente dentado, con (1)2 a 5 espinas por lado, espinas de 0.5 a 2 mm de largo, venación reticulada, vena media conspicua en el envés, de color gris o verde pálido opaco, más pálidos en el envés; racimos cortos subumbelados, laxos, de 2.5 a 4 cm de largo, con 3 a 5 flores, pedúnculo de la inflorescencia aplanado, de 4 a 10 mm de largo, brácteas florales triangulares, de 1.5 a 2.5 mm de largo, por 1 a 2.5 mm de ancho, pedicelos florales de 10 a 20 mm de largo, bracteolas angostamente triangulares, de posición variable; flores de color amarillo brillante; sépalos externos triangulares, de 2 mm de largo, por 1.5 mm de ancho, sépalos medios elípticos, de 3.5 a 4 mm de largo, por 2 a 2.5 mm de ancho, sépalos internos obovados, de 5 a 7 mm de largo, por 3 a 3.5 mm de ancho; pétalos elípticos, de 4 a 5 mm de largo, por 2.5 a 3 mm de ancho, ápice entero o ligeramente emarginado; estambres de 3.5 a 4 mm de largo, dentados; fruto subesférico, azul-pruinoso, obscuro, sin estilo, de 6.5 a 9 mm de largo, por 6 a 9 mm de ancho; semillas 6 a 8 por fruto, obovoides a elipsoides, de 3.5 a 4 mm de largo, por 2 a 2.5 mm de ancho, café-rojizas.

Planta muy rara y escasa en nuestra zona de estudio, se ha colectado en pastizales inducidos con elementos del matorral crasicaule de *Opuntia-Zaluzania* de la porción noreste de Guanajuato; fuera del área de estudio se registra como abundante en bosques de encino, pino piñonero y matorrales xerófilos. Alt. 2100-2300 m. Se ha colectado con flor en marzo y con fruto de junio a agosto.



Especie endémica de la Altiplanicie Mexicana, distribuida en el sur de N.L., (tipo: *C. H. Müller* y *K. K. Müller* 803 (A)), S.L.P., Gto.

Elemento extraordinariamente raro en el noreste de Guanajuato, en donde sólo se ha encontrado un individuo y en consecuencia se considera altamente vulnerable a desaparecer de la zona de estudio; este registro marca el límite sur de la distribución de la especie.

Guanajuato: 5 km al W de Pozos, municipio de San Luis de la Paz, sobre el camino a la autopista, *J. Rzedowski* 52621 (IEB); 6 km al W de Pozos, sobre el camino a la autopista, municipio de San Luis de la Paz, *J. Rzedowski* 44719 (IEB); *ibid.*, *J. Rzedowski* 53124 (IEB).

Esta especie tiene mucho parecido con *Berberis angustifolia* Hartw. ex Benth., del estado de Hidalgo, de la que difiere por la menor longitud de las hojas y de los foliolos, estos últimos con menos dientes por lado; por lo demás se ven muy pa-

recidas. Sin embargo, se requiere de estudios más detallados para poder decidir si se trata de una o dos especies. Si investigaciones futuras demostraran que son una sola especie, el nombre que le correspondería sería el de *Berberis angustifolia* Hartw. ex Benth., por ser el primero que se aplicó a este taxon.

Berberis pallida Hartw. ex Benth., Pl. Hartw. p. 34, no. 268. 1840. *Mahonia pallida* (Hartw.) Fedde, Bot. Jahrb. Syst. 31: 109. 1901. *Odostemon pallidus* (Hartw.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23: 271. 1922.

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: palo amarillo.

Arbusto de 1 a 3(4) m de alto; hojas de (6)10 a 35 cm de largo, con (5)9 a 15(17) foliolos subpecioulados, el par inferior más chico que los demás, peciolo de 0.5 a 2(3) cm de largo, foliolos lanceolados, ovado-elípticos a ampliamente elípticos o ampliamente oblongos, de 2 a 7(11) cm de largo, por 1 a 5 cm de ancho, ápice agudo, obtuso o redondeado, mucronado-espinoso, base cuneada a redondeada, asimétrica, margen entero o dentado-espinoso, con 3 a 11(14) espinas por lado, espinas de 0.5 a 3(5) mm de largo, venación fuertemente reticulada, la vena media impresa en el haz y resaltada en el envés, las venas secundarias y hasta las de cuarto orden resaltadas en el haz, formando una retícula densa que contrasta con la superficie del foliolo, que es café-verdosa a verde oscura, lustrosa por arriba, más pálida y opaca por debajo; inflorescencias en forma de panículas de 10 a 30(40) cm de longitud, brácteas de la inflorescencia triangulares, de 4 a 15 mm de largo, por 5 a 15 mm de ancho, brácteas florales triangulares a triangular-lanceoladas, de 2 a 10(15) mm de largo, por 1 a 5 mm de ancho, pedicelos 4 a 15 mm de longitud, bracteolas insertas en o por debajo de la mitad del pedicelo, ovado-lanceoladas, de 1 a 3 mm de largo, por 1 mm de ancho; flores amarillas, blanco-amarillentas o blancas; sépalos externos ampliamente ovados a ampliamente elípticos, de 2.5 a 5 mm de largo, por 2 a 3 mm de ancho, sépalos medios elípticos a ampliamente elípticos, de 5 a 6.5 mm de largo, por 3 a 4.5 mm de ancho, los internos elípticos a ampliamente elípticos, de (5)6 a 7 mm de largo, por 3 a 5 mm de ancho; pétalos obovados a elípticos, emarginados, de 4.5 a 6 mm de largo, por 2 a 4 mm de ancho; estambres de 3 a 4 mm de largo, con dientes muy cortos; fruto globoso, azul-pruinoso, de 8 a 11 mm de diámetro, sin estilo, semillas 2 a 9, obovoides, triquetras, de 5 a 7 mm de largo, por 2 a 4 mm de ancho, de color café oscuro.

Arbusto más o menos común en el noreste de Guanajuato y Querétaro, en bosques de pino piñonero-enebro, encino, pino-encino y con menor frecuencia en bosque mesófilo de montaña, o en la transición de éstos con el bosque tropical caducifolio o el matorral submontano. Alt. 1000-2400 m. Se ha encontrado en flor casi durante todo el año, de febrero a diciembre, sin embargo, el período de


máxima floración se presenta de abril a julio; se ha registrado con fruto de junio a enero.

Especie endémica de la Sierra Madre Oriental y de otras serranías formadas por rocas calizas al sur del Eje Volcánico Transversal, en los estados de Tamps., Gto., Qro., Hgo. (lectotipo: *K. T. Hartweg* 268 (K-000407229, ex Hb. Bentham.)), Pue., Oax.


Es un arbusto más o menos común, debido a su plasticidad adaptativa, puede crecer en diversos ambientes, por lo que no parece tener problemas de supervivencia.

Guanajuato: Peñas del Bernalejo, municipio de San Luis de la Paz, *S. Zamudio et al.* 11568 (IEB); El Vergel de Bernalejo, 12 km de Mesas de Jesús, municipio de San Luis de la Paz, *E. Pérez* 4786 (IEB); 43.2 km de Xichú por la brecha a Río Blanco, municipio de Xichú, *E. Pérez y S. Zamudio* 3568 (IEB); Atarjeita, municipio de Atarjea, *E. Ventura y E. López* 9083 (IEB); El Pinalito, por Carricillo, municipio de Atarjea, *E. Ventura y E. López* 9219 (IEB); Casas Viejas, 8 km al S de La Joya, municipio de Atarjea, *E. Ventura y E. López* 6510 (IEB).

Querétaro: 3-4 km al WSW de La Florida, municipio de Arroyo Seco, *E. Carranza* 3085 (IEB); 2 km al S de La Florida, por el camino a Xichú, municipio de Arroyo Seco, *E. Pérez y S. Zamudio* 3264 (IEB); 2 km al W de El Jardín, municipio de Arroyo Seco, *E. Carranza* 1843 (IEB); ±10 km del Puerto de Ayutla, camino a Santa María de Cocos, municipio de Arroyo Seco, *E. Carranza* 1896 (IEB); el Sótano de Santa María de Cocos, municipio de Arroyo Seco, *S. Zamudio y E. Carranza* 6440 (IEB); El Sótano, ±4 km al S de Santa María de Cocos, municipio de Arroyo Seco, *A. Herrera* 131 (IEB); Sótano del Barro, al S de Santa María de Cocos, municipio de Arroyo Seco, *E. Carranza* 2949 (IEB); alrededores de la boca del Sótano El Barro, Santa María de Cocos, municipio de Arroyo Seco, *J. Treviño y J. M. Olvera* 179 (QMEX); 371 (QMEX); ±3 km al WSW de El Lindero, municipio de Jalpan, *E. Carranza* 1107 (IEB); 2 km al WSW de Saldiveña, municipio de Jalpan, *E. Carranza* 1859 (IEB); 10 km al NW de El Madroño, municipio de Landa, *J. Rzedowski* 44106 (IEB); 8-9 km por la brecha a Tres Lagunas, municipio de Landa, *E. Carranza* 1708 (IEB); cerca de Tres Lagunas, municipio de Landa, *J. Rzedowski* 46694 (IEB); Puerto Colorado, aproximadamente 6 km al N de Acatitlán de Zaragoza, municipio de Landa, *S. Zamudio y E. Carranza* 7170 (IEB); 3 km al SE de El Lobo, municipio de Landa, *L. M. Chávez* 144 (IEB); 1.5 km al SW de El Naranjo, municipio de Landa, *H. Rubio* 1508 (IEB); *ibid.*, *H. Rubio* 1776 (IEB); El Encinote, 1 km al N de Puerto del Sabino, municipio de Landa, *H. Rubio* 148 (IEB); El Banco, 1.5 km al poniente del Puerto Hondo, municipio de Landa, *P. Tenorio e I. Rubio* 19204 (MEXU); 3 km al S de La Tinaja, municipio de Pinal de Amoles, *E. Carranza* 947 (IEB); ±1 km al NE de Pinal de Amoles, municipio de Pinal de Amoles, *E. Carranza* 520 (IEB); 2 km al NE de Pinal de Amoles, sobre la carretera a Jalpan, municipio de Pinal de Amoles,



J. Rzedowski 43120 (IEB); *ibid.*, *E. Pérez* 4348 (IEB); 3-4 km al ENE de Pinal de Amoles, municipio de Pinal de Amoles, *E. Lugo* 13 (IEB); Joya de Los Granadillos, 3 km al S de Los Pinos, municipio de Pinal de Amoles, *S. Zamudio* 6581 (IEB); al S de Los Pinos, municipio de Pinal de Amoles, *E. Carranza* 2480 (IEB); al W de Cuatro Palos, municipio de Pinal de Amoles, *E. Carranza* 3158 (IEB); 2-3 km al NNW de San Pedro El Viejo, municipio de Pinal de Amoles, *E. Carranza* 2190 (IEB); 4 km al NE de San Pedro El Viejo, sobre el camino a La Yerbabuena, municipio de Pinal de Amoles, *J. Rzedowski* 43034 (IEB); 1.5 km al SE de San Pedro Escanela, municipio de Pinal de Amoles, *R. Fernández* 2483 (ENCB, IEB); barrancas en los alrededores del Madroño, municipio de Pinal de Amoles, *R. Hernández et al.* 10183 (IEB, QMEX); 80 km NE Querétaro, above Pilón on road to Pinal de Amoles, municipio de Peñamiller, *R. McVaugh* 10354 (MEXU, MICH, US); 1-2 km al NE de Cuesta Colorada, municipio de Peñamiller, *E. Carranza* 2618 (IEB); 2 km al N de



Berberis pallida Hartw. A. variación en las hojas; B. variación en la forma y tamaño de los folíolos. Ilustrado por Rogelio Cárdenas y reproducido de Acta Bot. Mex. 87: 51, 53. 2009.

Cuesta Colorada por la carretera a Pinal de Amoles, municipio de Peñamiller, S. Zamudio y E. Zamudio 11001 (IEB); Cuesta Colorada-El Madroño, municipio de Peñamiller, R. Hernández et al. 11429 (QMEX); 13 km al NW de San Joaquín por el camino a Bucareli, municipio de San Joaquín, S. Zamudio 7299 (IEB); ruinas Las Ranas, 2 km al N de San Joaquín, municipio de San Joaquín, R. Fernández 3268 (IEB); ibid., R. Fernández 4704 (ENCB); 3.5 km al W de La Veracruz, por el camino a La Mora, municipio de Cadereyta, S. Zamudio y E. Zamudio 10278 (IEB).

El concepto de *Berberis pallida* aceptado aquí, de acuerdo con el tipo depositado en Kew, no concuerda con el de Marroquín (1972), ya que las plantas que este autor consideró dentro de la especie forman parte de la variación de *Berberis hartwegii* Benth. En cambio, los ejemplares incluidos aquí en *Berberis pallida* coinciden con las tratadas por Marroquín (op. cit.) como *Berberis ilicina* Schltdl., nombre que es un sinónimo de *Berberis trifolia* Schltdl. & Cham., planta que crece en los terrenos planos o llanos entre Alchichica, Puebla y Perote, Veracruz.

Por otra parte, el ejemplar de R. McVaugh 10354 (MEXU, MICH, US), colectado 80 km al noreste Querétaro, arriba del Pilon en el camino a Pinal de Amoles, fue incluido erróneamente por Marroquín (1972) en las exsiccata de *Berberis zimapanana* (Fedde) Marroquín & Laferr. (considerado aquí sinónimo de *B. hartwegii* Benth.); sin embargo, el espécimen coincide más con *B. pallida*.

Marroquín (1972), afirmó que una característica importante para reconocer a la especie (a la que él se refiere como *Berberis ilicina*) es la presencia de estípulas con margen membranáceo y puntas laterales libres; sin embargo, este carácter se ha observado en mayor o menor grado en todas las especies tratadas en esta flora, por lo que no resulta de utilidad para diferenciarlas.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES DE PLANTAS

- acebo, 7
- agrillo, 21
- agrito, 21
- agritos, 21
- Berberidaceae, 1
- Berberis*, 1, 2
 - B. albicans*, 3, 4, 5, 6
 - B. alpina*, 3, 7, 8, 9
 - B. angustifolia*, 26, 27
 - B. chochoco*, 3, 10, 11
 - B. gracilis*, 4, 12, 13, 15
 - B. gracilis* var. *madrensis*, 12, 14, 16
 - B. hartwegii*, 3, 16, 18, 19, 20, 21, 31
 - B. ilicina*, 31
 - B. moranensis*, 4, 21, 22, 24
 - B. muelleri*, 3, 25, 26
 - B. pallida*, 3, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31
 - B. paxii*, 16, 19
 - B. pinnata*, 21
 - B. schiedeana*, 7, 10
 - B. tinctoria*, 10
 - B. trifolia*, 10, 31
 - B. zimapana*, 16, 19, 31
- cachisdá, 21
- camisdá, 21
- chipar, 25
- chipar cancino, 12
- chochoco, 10, 16
- Chrysodendron tinctoria*, 10, 12
- cigarrillo, 16
- encino, 9, 12, 14, 17, 23, 25, 27
- enebro, 14, 27
- ixcapul serrano, 21
- laurel cimarrón, 16
- Mahonia*, 2
 - M. chochoco*, 10
 - M. gracilis*, 12
 - M. hartwegii*, 16
 - M. moranensis*, 21
 - M. muelleri*, 25
 - M. pallida*, 27
 - M. paxii*, 16, 17
 - M. pinnata*, 21
 - M. schiedeana*, 7
 - M. subintegrifolia*, 12
 - M. tinctoria*, 10
 - M. trifolia*, 7
 - M. zimapana*, 16, 17
- Odostemon*, 2
 - O. chochoco*, 10
 - O. gracilis*, 12
 - O. hartwegii*, 16
 - O. pallidus*, 27
 - O. paxii*, 16
 - O. trifolius*, 7
- Opuntia*, 25
- ortiga, 4
- oyamel, 9, 23
- palo amarillo, 7, 10, 12, 16, 21, 27
- palo de teñir, 21
- palo jarilla, 21
- pino, 9, 14, 17, 23, 27
- pino piñonero, 6, 12, 14, 17, 19, 25, 27
- quisquirindin, 21
- quisquiringüin, 21
- retamilla, 21
- tiripo, 21
- xoxoco, 10, 16, 21
- yagabuxe, 21
- Zaluzania*, 25

I

II


III

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MUNICIPIOS DE QUERÉTARO MUNICIPIOS DE MICHOACÁN

32 Abasolo
 43 Acámbaro
 30 Apaseo El Alto
 29 Apaseo El Grande
 7 Atarjea
 28 Celaya
 27 Comonfort
 45 Coroneo
 36 Cortazar
 21 Cuerámbaro
 14 Doctor Mora
 11 Dolores Hidalgo
 10 Guanajuato
 33 Huanímbaro
 22 Irapuato
 35 Jaral del Progreso
 44 Jerécuaro
 25 Juventino Rosas
 8 León
 19 Manuel Doblado
 38 Moroleón
 1 Ocampo
 31 Pénjamo
 23 Pueblo Nuevo
 17 Purísima del Rincón
 20 Romita
 24 Salamanca
 41 Salvatierra
 3 San Diego de la Unión
 2 San Felipe
 18 San Francisco del Rincón
 13 San José Iturbide
 4 San Luis de la Paz
 12 San Miguel de Allende
 16 Santa Catarina
 40 Santiago Maravatío
 9 Silao
 46 Tarandacuao
 42 Tarimoro
 15 Tierra Blanca
 39 Uriangato
 34 Valle de Santiago
 5 Victoria
 26 Villagrán
 6 Xichú
 37 Yuriria

18 Amealco
 1 Arroyo Seco
 11 Cadereyta
 9 Colón
 8 El Marqués
 12 Ezequiel Montes
 15 Huimilpan
 2 Jalpan
 3 Landa
 16 Pedro Escobedo
 4 Peñamiller
 5 Pinal de Amoles
 7 Querétaro
 6 San Joaquín
 17 San Juan del Río
 13 Tequisquiapan
 10 Tolimán
 14 Villa Corregidora

53 Acuitzio
 24 Álvaro Obregón
 9 Angamacutiro
 32 Angangueo
 36 Coeneo
 28 Contepec
 21 Copándaro de Galeana
 22 Cuitzeo
 40 Charo
 34 Cherán
 33 Chilchota
 19 Chucándiro
 6 Churintzio
 5 Ecuandureo
 27 Epitacio Huerta
 47 Erongarícuaro
 20 Huandacareo
 18 Huaniqueo
 51 Huiramba
 41 Indaparapeo
 29 Irimbo
 2 La Piedad
 50 Lagunillas
 26 Maravatío
 38 Morelia
 44 Nahuatzen
 3 Numarán
 10 Panindícuaro
 43 Paracho
 49 Pátzcuaro
 8 Penjamillo
 15 Purépero
 11 Puruándiro
 42 Queréndaro
 37 Quiroga
 23 Santa Ana Maya
 52 Santa Clara del Cobre
 30 Senguio
 4 Sixto Verduzco
 14 Tangancícuaro
 39 Tarímbaro
 46 Tingambato
 31 Tlalpujahua
 13 Tlazazalca
 48 Tzintzuntzan
 45 Uruapan
 16 Villa Jiménez
 17 Villa Morelos
 1 Yurécuaro
 35 Zacapu
 12 Zamora
 7 Zináparo
 25 Zinapécuaro



FASCÍCULOS PUBLICADOS

- Acanthaceae. T. Daniel y S. Acosta. (117)
 Aceraceae. G. Calderón de Rzedowski. (94)
 Actinidiaceae. V. W. Steinmann. (106)
 Aizoaceae. G. Ocampo. (102)
 Alismataceae. A. Novelo. (111)
 Alstroemeriaceae. R. Galván y Y. Martínez. (144)
 Anacardiaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (78)
 Apocynaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (70)
 Aquifoliaceae. E. Carranza. (127)
 Araceae. T. B. Croat y M. Carlsen. (114)
 Araliaceae. A. R. López-Ferrari. (20)
 Asphodelaceae. R. Galván y Y. Martínez. (145)
 Balsaminaceae. G. Calderón de Rzedowski. (68)
 Basellaceae. G. Calderón de Rzedowski. (59)
 Begoniaceae. Y. Ramírez-Amezcu. (159)
 Betulaceae. E. Carranza y X. Madrigal Sánchez. (39)
 Bignoniaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (22)
 Blechnaceae. M. Palacios-Rios y V. Hernández. (95)
 Bombacaceae. E. Carranza y A. Blanco. (90)
 Buddlejaceae. G. Ocampo. (115)
 Burmanniaceae. S. Zamudio. (110)
 Burseraceae. J. Rzedowski y F. Guevara Féfer. (3)
 Buxaceae. R. Fernández Nava. (27)
 Campanulaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (58)
 Cannaceae. G. Calderón de Rzedowski. (64)
 Capparaceae. F. G. Lorea-Hernández. (130)
 Caprifoliaceae. J. Á. Villarreal Q. (88)
 Caricaceae. G. Calderón de Rzedowski y J. A. Lomelí. (17)
 Cecropiaceae. S. Carvajal y C. Peña-Pinela. (53)
 Cistaceae. G. Calderón de Rzedowski. (2)
 Clethraceae. L. M. González-Villarreal. (47)
 Chloranthaceae. G. Calderón de Rzedowski. (141)
 Cochlospermaceae. G. Calderón de Rzedowski. (28)
 Commelinaeae. A. Espejo-Serna, A. R. López-Ferrari y J. Ceja-Romero. (162)
 Compositae. Tribu Anthemideae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (60)
 Compositae. Tribu Cardueae. E. García y S. D. Koch. (32)
 Compositae. Tribu Helenieae. J. Á. Villareal Q., J. L. Villaseñor y R. Medina L. (140).
 Compositae. Tribu Heliantheae I. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (157)
 Compositae. Tribu Lactuceae. G. Calderón de Rzedowski. (54)
 Compositae. Tribu Tageteae. J. Á. Villarreal Q. (113)
 Compositae. Tribu Vernonieae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (38)
 Connaraceae. G. Calderón de Rzedowski. (48)
 Convolvulaceae I. E. Carranza. (151)
 Convolvulaceae II. E. Carranza. (155)
 Coriariaceae. G. Calderón de Rzedowski. (5)
 Cornaceae. E. Carranza. (8)
 Crassulaceae. E. Pérez-Calix. (156)
 Crossosomataceae. G. Calderón de Rzedowski. (55)
 Cucurbitaceae. R. Lira. (92)
 Cupressaceae. S. Zamudio y E. Carranza. (29)
 Dipsacaceae. G. Calderón de Rzedowski. (15)
 Ebenaceae. E. Carranza. (83)
 Elatinaceae. V. W. Steinmann. (146)
 Eriocaulaceae. G. Calderón de Rzedowski. (46)
 Flacourtiaceae. G. Calderón de Rzedowski. (41)
 Fouquieriaceae. S. Zamudio. (36)
 Garryaceae. E. Carranza. (49)
 Gentianaceae. J. Á. Villarreal Q. (65)
 Geraniaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (40)
 Gesneriaceae. E. Pérez-Calix. (84)
 Gramineae. Subfamilia Aristidoideae. J. Valdés Reyna y K. W. Allred. (137)
 Gramineae. Subfamilia Ehrhartoideae. V. W. Steinmann. (154)
 Grossulariaceae. E. Pérez-Calix. (138)
 Guttiferae. C. Rodríguez. (45)
 Hamamelidaceae. E. Carranza. (125)
 Heliconiaceae. G. Calderón de Rzedowski. (161)
 Hippocrateaceae. E. Carranza. (98)
 Hydrangeaceae. E. Pérez-Calix. (126)
 Hydrophyllaceae. E. Pérez-Calix y E. Carranza (139)
 Hymenophyllaceae. L. Pacheco. (14)
 Juglandaceae. E. Pérez-Calix. (96)
 Juncaceae. R. Galván Villanueva. (104)
 Koeberliniaceae. G. Calderón de Rzedowski. (57)
 Krameriaceae. J. Á. Villarreal Q. y M. A. Carranza P. (76).
 Lauraceae. H. van der Werff y F. Lorea. (56)
 Leguminosae. Subfamilia Caesalpinoideae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (51)

FASCÍCULOS PUBLICADOS (Continuación)

- Leguminosae. Subfamilia Mimosoideae. J. Gloria Andrade M., G. Calderón de Rzedowski, S. L. Camargo-Ricalde, R. Grether, H. M. Hernández, A. Martínez-Bernal, L. Rico, J. Rzedowski y M. Sousa S. (150)
- Lennoaceae. G. Calderón de Rzedowski. (50)
- Lentibulariaceae. S. Zamudio. (136)
- Liliaeaceae. A. Novelo. (118)
- Linaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (6)
- Loasaceae. G. Calderón de Rzedowski. (7)
- Lophosoriaceae. M. Palacios-Rios. (25)
- Lythraceae. S. A. Graham. (24)
- Malvaceae. P. A. Fryxell. (16)
- Marantaceae. G. Calderón de Rzedowski. (97)
- Marattiaceae. M. Palacios-Rios. (13)
- Martyniaceae. G. Calderón de Rzedowski. (66)
- Mayacaceae. A. Novelo y L. Ramos. (82)
- Melastomataceae. F. Almeda. (10)
- Meliaceae. G. Calderón de Rzedowski y M. T. Germán. (11)
- Menispermaceae. G. Calderón de Rzedowski. (72)
- Molluginaceae. G. Ocampo. (101)
- Moraceae. S. Carvajal. (147)
- Muntingiaceae. G. Calderón de Rzedowski. (108)
- Nyctaginaceae. R. Spellenberg. (93)
- Nymphaeaceae. A. Novelo y J. Bonilla-Barbosa. (77)
- Olacaceae. G. Calderón de Rzedowski. (34)
- Oleaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (124)
- Opiliaceae. E. Carranza. (81)
- Orchidaceae. Tribu Epidendreae. J. García-Cruz, L. M. Sánchez, R. Jiménez y R. Solano. (119)
- Orchidaceae. Tribu Maxillarieae. R. Jiménez, L. M. Sánchez y J. García-Cruz. (67)
- Orobanchaceae. G. Calderón de Rzedowski. (69)
- Osmundaceae. M. Palacios-Rios. (12)
- Palmae. H. Quero. (129)
- Papaveraceae. G. Calderón de Rzedowski. (1)
- Passifloraceae. G. Calderón de Rzedowski, J. Rzedowski y J. M. MacDougal. (121)
- Phyllanthaceae. V. W. Steinmann. (152)
- Phyllonomaceae. E. Pérez-Calix. (74)
- Phytolaccaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (91)
- Picramniaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (109)
- Plagiogyriaceae. M. Palacios-Rios y M. García Caluff. (62)
- Plantaginaceae. G. Ocampo. (120)
- Platanaceae. E. Carranza. (23)
- Plumbaginaceae. G. Calderón de Rzedowski. (44)
- Podocarpaceae. S. Zamudio. (105)
- Podostemaceae. A. Novelo y C. T. Philbrick. (87)
- Polemoniaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (33)
- Polygonaceae. C. Castillejos y E. Solano. (153)
- Pontederiaceae. A. Novelo y L. Ramos. (63)
- Potamogetonaceae. A. Novelo. (133)
- Primulaceae. G. Ocampo. (89)
- Proteaceae. G. Calderón de Rzedowski. (143)
- Pterostemonaceae. E. Pérez-Calix. (116)
- Putranjivaceae. V. W. Steinmann. (99)
- Rafflesiaceae. E. Carranza. (107)
- Resedaceae. G. Calderón de Rzedowski. (35)
- Rhamnaceae. R. Fernández Nava. (43)
- Rosaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (135)
- Sabiaceae. V. W. Steinmann. (148)
- Salicaceae. E. Carranza. (37)
- Sambucaceae. J. Á. Villarreal Q. (85)
- Sapindaceae. G. Calderón de Rzedowski y J. Rzedowski. (142)
- Sapotaceae. E. Carranza. (132)
- Saururaceae. G. Calderón de Rzedowski. (42)
- Saxifragaceae. E. Pérez-Calix. (128)
- Smilacaceae. G. Calderón de Rzedowski y J. Rzedowski. (26)
- Staphyleaceae. E. Carranza. (122)
- Styracaceae. E. Carranza. (21)
- Symplocaceae. H. Díaz-Barriga. (19)
- Taxaceae. S. Zamudio. (9)
- Taxodiaceae. E. Carranza. (4)
- Theaceae. E. Carranza. (73)
- Thelypteridaceae. B. Pérez-García, R. Riba y A. R. Smith. (79)
- Thymelaeaceae. G. Calderón de Rzedowski. (123)
- Tiliaceae. E. Pérez-Calix. (160)
- Tropaeolaceae. G. Calderón de Rzedowski. (103)
- Turneraceae. G. Calderón de Rzedowski. (80)
- Ulmaceae. E. Pérez-Calix y E. Carranza. (75)
- Urticaceae. V. W. Steinmann. (134)
- Valerianaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (112)
- Verbenaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (100)
- Viburnaceae. J. Á. Villarreal Q. (86)

FASCÍCULOS PUBLICADOS (Continuación)

Violaceae. H. E. Ballard, Jr. (31)	Zamiaceae. A. P. Vovides. (71)
Vitaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (131)	Zannichelliaceae. G. Calderón de Rzedowski. (149)
Vittariaceae. M. Palacios-Rios. (52)	Zingiberaceae. A. P. Vovides. (18)
Xyridaceae. G. Calderón de Rzedowski. (61)	Zygophyllaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski. (30)

Fascículos complementarios:

- I. Presentación. Guía para los autores y normas editoriales.
- II. Listado florístico preliminar del estado de Querétaro. E. Argüelles, R. Fernández y S. Zamudio.
- III. Listado preliminar de especies de pteridofitas de los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. H. Díaz Barriga y M. Palacios-Rios.
- IV. Estudio florístico de la Cuenca del Río Chiquito de Morelia, Michoacán, México. C. Medina y L. S. Rodríguez.
- V. Lista de la flora espontánea del jardín botánico "El Charco del Ingenio", San Miguel de Allende, Guanajuato (México). W. L. Meagher.
- VI. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección I (Gymnospermae; Angiospermae: Acanthaceae-Commelinaceae). L. S. Rodríguez Jiménez y J. Espinosa Garduño.
- VII. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección II (Angiospermae: Compositae). J. Espinosa Garduño y L. S. Rodríguez Jiménez.
- VIII. Végétation du nord-ouest du Michoacán, Mexique. J.-N. Labat.
- IX. Los pastizales calcífilos del estado de Guanajuato. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
- X. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección III (Angiospermae: Connaraceae-Myrtaceae excepto Fagaceae, Gramineae, Krameriaceae y Leguminosae). L. S. Rodríguez Jiménez y J. Espinosa Garduño.
- XI. A preliminary checklist of the mosses of Guanajuato, Mexico. C. Delgadillo M. y Á. Cárdenas S.
- XII. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección IV (Angiospermae: Fagaceae, Gramineae, Krameriaceae, Leguminosae). J. Espinosa Garduño y L. S. Rodríguez Jiménez.
- XIII. Flora y vegetación de la cuenca del Lago de Zirahuén, Michoacán, México. E. Pérez-Calix.
- XIV. Nota sobre la vegetación y la flora del noreste del estado de Guanajuato. J. Rzedowski, G. Calderón de Rzedowski y R. Galván.
- XV. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección V (Angiospermae: Najadaceae-Zygophyllaceae). L. S. Rodríguez Jiménez y J. Espinosa Garduño.
- XVI. Elizabeth Argüelles, destacada colectora botánica de Querétaro. G. Calderón de Rzedowski y J. Rzedowski.
- XVII. Los principales colectores botánicos de Guanajuato, Querétaro y norte de Michoacán. J. Rzedowski.
- XVIII. Contribución al conocimiento de las plantas del género *Ipomoea* L. (Convolvulaceae) en el estado de Guanajuato, México. E. Carranza.
- XIX. Flora arvense asociada al cultivo de maíz de temporal en el valle de Morelia, Michoacán, México. Ma. A. Chávez Carbajal y F. Guevara-Féfer.
- XX. Manual de malezas de la región de Salvatierra, Guanajuato. G. Calderón de Rzedowski y J. Rzedowski.
- XXI. Conocimiento actual de la flora y la diversidad vegetal del estado de Guanajuato, México. E. Carranza.
- XXII. Revisión y actualización del inventario de la flora espontánea del jardín botánico "El Charco del Ingenio", San Miguel de Allende, Guanajuato (México). W. L. Meagher.
- XXIII. Diversidad del género *Ipomoea* L. (Convolvulaceae) en el estado de Michoacán, México. E. Carranza.
- XXIV. Lista preliminar de árboles silvestres del estado de Guanajuato. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.

Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes Núm. 163
consta de 400 ejemplares y fue impreso en la
Imprenta Tavera Hermanos, S.A. de C.V.
Ave. Lázaro Cárdenas Núm. 3052
Morelia, Mich.
el mes de diciembre de 2009

Toda correspondencia referente a la
adquisición de números o canje, debe dirigirse a:

***FLORA DEL BAJÍO
Y DE REGIONES ADYACENTES***

Instituto de Ecología, A.C.
Centro Regional del Bajío
Apartado postal 386
61600 Pátzcuaro, Michoacán
MÉXICO
rosamaria.murillo@inecol.edu.mx